
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

ΜΑΘΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

10:50



φροντιστήρια
ΠΟΥΚΑΜΙΣΣΑΣ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 6-6-2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: **ΒΙΟΛΟΓΙΑ**

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

- A1: γ
A2: β
A3: β
A4: γ
A5: δ

ΘΕΜΑ Β

- B1.** α) α: νερό
β: υπεροξειδίο του υδρογόνου
γ: καταλάση

β) Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια, συνεπώς ανήκουν στις πρωτεΐνες.

γ) Τα ένζυμα αποτελούνται από αμινοξέα.

δ) Τα ένζυμα δομούνται από 20 διαφορετικά αμινοξέα, τα οποία διαφέρουν στη χημική δομή της πλευρικής τους ομάδας.

B2. α) Μία **αποικία** είναι ένα σύνολο από μικροοργανισμούς, που έχουν προέλθει από διαδοχικές διαιρέσεις ενός κυττάρου, όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό θρεπτικό υλικό. Οι αποικίες είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό.

β) **Στατική φάση** ονομάζεται η φάση της κλειστής καλλιέργειας, κατά την οποία ο πληθυσμός των μικροοργανισμών δεν αυξάνεται, λόγω εξάντλησης κάποιου θρεπτικού συστατικού ή λόγω συσσώρευσης τοξικών προϊόντων από το μεταβολισμό των μικροοργανισμών.

γ) **Επιχιασμός** ονομάζεται το φαινόμενο, που πραγματοποιείται κατά την πρόφαση Ι της Μείωσης, κατά το οποίο οι μη αδελφές χρωματίδες των ομόλογων χρωμοσωμάτων «μπερδεύονται» μεταξύ τους λόγω της σύναψης και δημιουργούνται χιάσματα, στα οποία οι χρωματίδες αποκόπτονται και επανασυγκολλώνται αφού πρώτα έχουν ανταλλάξει ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα.

B3. Τα μειονεκτήματα των εμβολίων από νεκρές ή εξασθενημένες μορφές είναι τα εξής:

- Δεν μπορούν όλοι οι μολυσματικοί παράγοντες να αναπτυχθούν σε κυτταροκαλλιέργεια και έτσι δεν έχουν αναπτυχθεί εμβόλια για πολλές ασθένειες.
- Ορισμένοι ιοί των ζώων αναπτύσσονται με αργό ρυθμό σε κυτταροκαλλιέργειες και συνεπώς η απόδοσή τους είναι πολύ χαμηλή, άρα και τα εμβόλια γίνονται πολύ ακριβά.
- Χρειάζονται μεγάλες προφυλάξεις, για να μην εκτεθεί το προσωπικό που κατασκευάζει τα εμβόλια στον παθογόνο παράγοντα.
- Δεν είναι όλα τα εμβόλια αποτελεσματικά για μια ασθένεια π.χ. για τον ιό του AIDS γίνονται συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες κατασκευής εμβολίου.

B4. Σε ένα κύτταρο φύλλου λεμονιάς η πρωτεϊνσύνθεση πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα, στην επιφάνεια του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες, όπου υπάρχουν οι δομές στις οποίες συμβαίνει η πρωτεϊνσύνθεση, τα ριβοσώματα.

B5. Η χρησιμοποίηση διαγονιδιακών φυτών και ζώων για την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων. Αυτά επιγραμματικά είναι τα παρακάτω:

- Επιλογή και προσθήκη μόνο επιθυμητών ιδιοτήτων με ταυτόχρονη διατήρηση των παλαιών επιθυμητών χαρακτηριστικών.
- Ταχύτατη παραγωγή βελτιωμένων φυτών και ζώων σε σχέση με παραδοσιακές τεχνικές.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

A) Μη διαχωρισμός ζεύγους ομόλογων χρωμοσωμάτων.

B) Τα χρωμοσώματα είναι 38.

Γ) Το κύτταρο B έχει 36 μόρια και το κύτταρο A έχει 40 μόρια DNA.

Δ) Το κύτταρο A θα δώσει δύο γαμέτες που θα περιέχουν 20 χρωμοσώματα ο καθένας αποτελούμενα από ένα μόριο DNA.

Το κύτταρο B θα δώσει δύο γαμέτες που θα περιέχουν 18 χρωμοσώματα ο καθένας αποτελούμενα από ένα μόριο DNA.

Γ2.

Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε μόνο τα γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα, τότε κατασκευάζουμε τις cDNA βιβλιοθήκες. Οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα αυτά και έχουν το πλεονέκτημα απομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλαδή των εξωνίων.

Για να κατασκευαστεί μία cDNA βιβλιοθήκη, απομονώνεται το ολικό «ώριμο» mRNA από κύτταρα που εκφράζουν το συγκεκριμένο γονίδιο.

Επομένως κάποιοι κλώνοι είναι ίδιοι γιατί τα γονίδια εκφράζονται και στους δύο τύπους κυττάρων και κάποιοι διαφορετικοί καθώς πρόκειται για τα ειδικά γονίδια του κάθε κυτταρικού τύπου.

Γ3.

Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη προκύπτει με την επεξεργασία του συνόλου του γενετικού υλικού που υπάρχει στο κύτταρο επομένως εάν διαφέρουν τα φυλετικά χρωμοσώματα θα διαφέρουν και κάποιοι κλώνοι. Οι κλώνοι δεν θα είναι ακριβώς ίδιοι καθώς οι δύο γαμέτες μπορεί να φέρουν το X ή Y χρωμόσωμα ενώ ταυτόχρονα λόγω του τυχαίου διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων τα γαμετικά κύτταρα θα έχουν και διαφορετικά αλληλόμορφα στις ομόλογες περιοχές γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό μοτίβο πέψης από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες και διαφορετικούς κλώνους.

Γ4.

Όπως φαίνεται από τις δοσμένες αναλογίες το χαρακτηριστικό των κόκκινων ματιών εμφανίζεται μόνο σε θηλυκά άτομα και των λευκών μόνο σε αρσενικά άτομα γεγονός που υποδεικνύει ότι πρόκειται για φυλοσύνδετο χαρακτηριστικό. Μαζί με το γεγονός της αντιστροφής του φαινοτύπου (μητέρα με λευκά μάτια και πατέρας με κόκκινα) ισχύει ότι

$X^K = \text{κόκκινο} > X^k = \text{λευκό}$ και οι γονότυποι των γονέων για το χαρακτηριστικό είναι

$X^K Y$ και $X^k X^k$.

Για το χαρακτηριστικό των μεγάλων και μικρών κεραιών οι αναλογία είναι ανεξαρτήτως φύλου 2:1 μεταξύ μεγάλων και μικρών αντίστοιχα, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη θνησιγόνου. Ταυτόχρονα με το γεγονός του ότι ο ένας γονέας έχει τις μικρές κεραιές και ο άλλος τις μεγάλες ισχύει ότι πρόκειται για πολλαπλά αλληλόμορφα.

$M^1 = \text{μεγάλο}$ $M^2 = \text{μικρό}$ $M^3 = \text{θνησιγόνο}$

Και οι γονότυποι των γονέων είναι:

$M^1 M^3$ του αρσενικού και $M^2 M^3$ του θηλυκού

Συνολικά:

P: $M^1 M^3 X^K Y * M^2 M^3 X^k X^k$

Γαμέτες $M^1 X^K, M^1 Y, M^3 X^K, M^3 Y, M^2 X^k, M^3 X^k$

	$M^1 X^K$	$M^1 Y$	$M^3 X^K$	$M^3 Y$
$M^2 X^k$	$M^1 M^2 X^K X^k$	$M^1 M^2 X^k Y$	$M^2 M^3 X^K X^k$	$M^2 M^3 X^k Y$
$M^3 X^k$	$M^1 M^3 X^K X^k$	$M^1 M^3 X^k Y$	$M^3 M^3 X^K X^k$	$M^3 M^3 X^k Y$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

A) Πρόδρομο

5' UUC AUG GAA UUC CAU G(AAAGGG)UA GGG GAA UUC UAG CCC 3'

Ώριμο

5' UUC AUG GAA UUC CAU GUA GGG GAA UUC UAG CCC 3'

B) Αριθμός αμινοξέων: 8

Δ2.

α)

5' AATTCATG(AAAGGG)TAGGGG 3'
3' GGTAC(TTTCCC)ATCCCCTTAA 5'

β) Μετά την ενσωμάτωση δημιουργείται η εξής αλληλουχία:

5' GAATTCATGAAAGGGTAGGGGAATTC 3'

3' CTTAAGGTACTTTCCCATCCCCTTAA 5'

Μετά την ενσωμάτωση στο πλασμίδιο και τον μετασχηματισμό των βακτηρίων από το mRNA δεν αφαιρείται το εσώνιο και μεταφράζεται κανονικά, γιατί οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν μηχανισμούς ωρίμανσης του πρόδρομου mRNA.

Τα κωδικόνια του γονιδίου που μεταφράζονται είναι:

5' ATG AAA GGG 3'

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

